

DANMARKS TÆGER - EN OVERSIGT

Lars Skipper & Søren Tolsgaard

Dette afsnit er en oversigt over kendte tægearter i Danmark - ikke blot blomstertæger, men samtlige 539 arter fordelt på 34 familier.

Den seneste samlede fortegnelse over danske tæger blev publiceret i tidsskriftet Entomologiske Meddelelser (Andersen & Gaun 1974).

Det skal dog nævnes, at man på hjemmesiden www.miridae.dk har kunnet se en opdateret liste siden 2009. For en gennemgang af tidligere fortegnelser, se s. 12-13.

Arter, der er føjet til listen (Ny), har skiftet navn (Syn.) eller er flyttet til en anden familie (Fam.) siden Andersen & Gaun (1974) er angivet under "Komm." i oversigten. For uddybende kommentarer henvises til artsbeskrivelserne for blomstertægernes vedkommende (angivet med artens nummer); for de øvrige familier henvises til kommentarene umiddelbart efter oversigten (angivet med #).

Siden Andersen & Gaun (1974) er 53 nye arter føjet til den danske liste. Fire af disse er udskilt fra eksisterende danske arter.

Omvendt er tre arter udgået af listen, idet de nu er nedgraderet til synonyme (se s. 391). Det giver en netto tilgang på 50 arter (ca. 10 %). Herudover nævnes fire arter, der regnes som tilfældigt indslæbte i Danmark (se s. 391).

Det skal bemærkes, at også fotodokumenterede nye arter meldt på hjemmesiden www.fugleognatur.dk er medtaget på listen.

Systematik og nomenklatur følger med enkelte undtagelser Hoffmann (2011a). Kun for blomstertægerne angives underfamilier og tribuer.

De danske navne følger grundlæggende Projekt Danske Dyrenavne (Jørgensen et al. 1999). Herudover har Tolsgaard (2001; 2005; 2011) opdateret de danske navne i flere familier

Acanthosoma haemorrhoidale (stor løvtæge), *Phimodera humeralis* (klitsandtæge), *Coreus marginatus* (skræppetæge) (nymfe) og *Graphosoma lineatum* (stribetæge).



Videnskabeligt navn	Autor	Dansk navn	Komm.
Familie CERATOCOMBIDAE (1)			
<i>Ceratocombus coleoptratus</i>	(Zetterstedt, 1819)		#1 Fam.
Familie DIPSOCORIDAE (2)			
<i>Pachycoleus pusillimus</i>	(J. Sahlberg, 1870)		
<i>Pachycoleus waltli</i>	Fieber, 1860		
Familie NEPIDAE (2)		SKORPIONTÆGER	
<i>Nepa cinerea</i>	Linnaeus, 1758	Skorpiontæge	
<i>Ranatra linearis</i>	(Linnaeus, 1758)	Stavtæge	
Familie CORIXIDAE (31)		BUGSVØMMERE	
<i>Arctocoris germari</i>	(Fieber, 1848)	Klitbugsvømmer	
<i>Callicorixa praeusta</i>	(Fieber, 1848)	Sortbenet bugsvømmer	
<i>Callicorixa producta</i>	(Reuter, 1880)		
<i>Corixa affinis</i>	Leach, 1817		#2 Ny
<i>Corixa dentipes</i>	Thomson, 1869	Tandet bugsvømmer	
<i>Corixa panzeri</i>	Fieber, 1848	Strandbugsvømmer	
<i>Corixa punctata</i>	(Illiger, 1807)	Stor bugsvømmer	
<i>Cymatia bonstdorffii</i>	(C.R. Sahlberg, 1819)	Stor rovbogsvømmer	
<i>Cymatia coleoptrata</i>	(Fabricius, 1777)	Lille rovbogsvømmer	
<i>Glaenocoris propinqua</i>	(Fieber, 1860)	Mosebugsvømmer	
<i>Hesperocoris castanea</i>	(Thomson, 1869)	Brun bugsvømmer	

<i>Hesperocorixa linnaei</i>	(Fieber, 1848)	Dambugsvømmer		
<i>Hesperocorixa moesta</i>	(Fieber, 1848)			
<i>Hesperocorixa sahlbergi</i>	(Fieber, 1848)			
<i>Micronecta griseola</i>	Horváth, 1899			
<i>Micronecta minutissima</i>	(Linnaeus, 1758)			
<i>Micronecta poweri</i>	(Douglas & Scott, 1869)			
<i>Paracorixa concinna</i>	(Fieber, 1848)			
<i>Sigara distincta</i>	(Fieber, 1848)			
<i>Sigara falleni</i>	(Fieber, 1848)			
<i>Sigara fossarum</i>	(Leach, 1817)			
<i>Sigara hellensii</i>	(C.R. Sahlberg, 1819)	Bækbugsvømmer		
<i>Sigara iactans</i>	Jansson, 1983		#3	Ny
<i>Sigara lateralis</i>	(Leach, 1817)	Lille bugsvømmer		
<i>Sigara limitata</i>	(Fieber, 1848)			
<i>Sigara longipalis</i>	(J. Sahlberg, 1878)			
<i>Sigara nigrolineata</i>	(Fieber, 1848)			
<i>Sigara scotti</i>	(Douglas & Scott, 1868)			
<i>Sigara semistriata</i>	(Fieber, 1848)	Stribet bugsvømmer		
<i>Sigara stagnalis</i>	(Leach, 1817)	Brakvandsbugsvømmer		
<i>Sigara striata</i>	(Linnaeus, 1758)	Almindelig bugsvømmer		
Familie NAUCORIDAE (1)		VANDRØVERE		
<i>Ilyocoris cimicoides</i>	(Linnaeus, 1758)	Vandrøver		
Familie APHELOCHEIRIDAE (1)		DYBVANDSTÆGER		
<i>Aphelocheirus aestivalis</i>	(Fabricius, 1794)	Dybvandstæge		
Familie NOTONECTIDAE (6)		RYGGSVØMMERE		
<i>Notonecta glauca</i>	Linnaeus, 1758	Almindelig rygsvømmer		
<i>Notonecta lutea</i>	Müller, 1776	Gul rygsvømmer		
<i>Notonecta maculata</i>	Fabricius, 1794	Vandrer rygsvømmer		
<i>Notonecta obliqua</i>	Thunberg, 1787			
<i>Notonecta reuteri</i>	Hungerford, 1928			
<i>Notonecta viridis</i>	Delcourt, 1909	Brakvandsrygsvømmer	#4	Ny
Familie PLEIDAE (1)		DVÆRGRYGGSVØMMERE		
<i>Plea minutissima</i>	Leach, 1817	Dværgrygsvømmer		
Familie MESOVELIIDAE (1)				
<i>Mesovelia furcata</i>	Mulsant & Rey, 1852	Åkandevandløber		
Familie HEBRIDAE (2)				
<i>Hebrus pusillus</i>	(Fallén, 1807)			
<i>Hebrus ruficeps</i>	Thomson, 1871	Sphagnumtæge		
Familie HYDROMETRIDAE (2)		NÅLETÆGER		
<i>Hydrometra gracilentia</i>	Horváth, 1899			
<i>Hydrometra stagnorum</i>	(Linnaeus, 1758)	Almindelig nåletæge		
Familie VELIIDAE (4)		BÆKLØBERE		
<i>Microvelia buenoi</i>	Drake, 1920			
<i>Microvelia reticulata</i>	(Burmeister, 1835)	Dværgskøjteløber		
<i>Velia caprai</i>	Tamanini, 1947	Bækløber		
<i>Velia saulii</i>	Tamanini, 1947			
Familie GERRIDAE (9)		SKØJTELØBERE		
<i>Aquarius najas</i>	(De Geer, 1773)	Åskøjteløber		
<i>Aquarius paludum</i>	(Fabricius, 1794)	Søskøjteløber		
<i>Gerris argentatus</i>	Schummel, 1832	Lille skøjteløber		
<i>Gerris gibbifer</i>	Schummel, 1832	Vorteskojteløber		
<i>Gerris lacustris</i>	(Linnaeus, 1758)	Almindelig skøjteløber		
<i>Gerris lateralis</i>	Schummel, 1832			
<i>Gerris odontogaster</i>	(Zetterstedt, 1828)			
<i>Gerris thoracicus</i>	Schummel, 1832	Gulbrystet skøjteløber		

<i>Limnoporus rufoscutellatus</i>	(Latreille, 1807)	Vandreskøjteløber		
Familie SALDIDAE (17)		SPRINGTÆGER		
<i>Chartoscirta cincta</i>	(Herrich-Schaeffer, 1841)			
<i>Chartoscirta cocksii</i>	(Curtis, 1835)			
<i>Chartoscirta elegantula</i>	(Fallén, 1807)			
<i>Chiloxanthus pilosus</i>	(Fallén, 1807)			
<i>Halosalda lateralis</i>	(Fallén, 1807)	Saltspringtæge		
<i>Micracanthia marginalis</i>	(Fallén, 1807)	Mosespringtæge		
<i>Salda littoralis</i>	(Linnaeus, 1758)	Strandtæge		
<i>Salda morio</i>	Zetterstedt, 1838			
<i>Salda muelleri</i>	(Gmelin, 1790)			
<i>Saldula arenicola</i>	(Scholtz, 1847)			
<i>Saldula c-album</i>	(Fieber, 1859)			
<i>Saldula opacula</i>	(Zetterstedt, 1838)			
<i>Saldula orthochila</i>	(Fieber, 1859)	Tørbundsspringtæge		
<i>Saldula pallipes</i>	(Fabricius, 1794)			
<i>Saldula palustris</i>	(Douglas, 1874)			
<i>Saldula pilosella</i>	(Thomson, 1871)			
<i>Saldula saltatoria</i>	(Linnaeus, 1758)	Almindelig springtæge		
Familie TINGIDAE (20)		MASKETÆGER		
<i>Acalypta carinata</i>	(Panzer, 1806)			
<i>Acalypta gracilis</i>	(Fieber, 1844)			
<i>Acalypta nigrina</i>	(Fallén, 1807)			
<i>Acalypta parvula</i>	(Fallén, 1807)			
<i>Acalypta platycheila</i>	(Fieber, 1844)			
<i>Agramma laetum</i>	(Fallén, 1807)			
<i>Campylosteira verna</i>	(Fallén, 1826)			
<i>Derephysia foliacea</i>	(Fallén, 1807)	Blæremasketæge		
<i>Dictyla convergens</i>	(Herrich-Schaeffer, 1835)			
<i>Dictyla echii</i>	(Schränk, 1782)			
<i>Dictyonota fuliginosa</i>	A. Costa, 1853		#5	Ny
<i>Dictyonota strichnocera</i>	Fieber, 1844			
<i>Kalama tricornis</i>	(Schränk, 1801)		#6	Syn.
<i>Physatocheila costata</i>	(Fabricius, 1794)			
<i>Physatocheila dumetorum</i>	(Herrich-Schaeffer, 1838)			
<i>Stephanitis oberti</i>	(Kolenati, 1857)	Blåbærtæge		
<i>Stephanitis rhododendri</i>	Horváth, 1905	Rhododendrontæge		
<i>Tingis ampliata</i>	(Herrich-Schaeffer, 1838)			
<i>Tingis cardui</i>	(Linnaeus, 1758)	Tidseltæge		
<i>Tingis reticulata</i>	Herrich-Schaeffer, 1835			
Familie MICROPHYSIDAE (5)				
<i>Loricula bipunctata</i>	(Perris, 1857)		#7	Ny
<i>Loricula elegantula</i>	(Baerensprung, 1858)			
<i>Loricula pselaphiformis</i>	Curtis, 1833			
<i>Loricula coleoprata</i>	(Fallén, 1807)		#8	Syn.
<i>Loricula exilis</i>	(Fallén, 1807)		#9	Syn.
Familie MIRIDAE (212)		BLOMSTERTÆGER		
Underfamilie BRYOCORINAE (13)				
Tribus BRYOCORINI (2)				
<i>Bryocoris pteridis</i>	(Fallén, 1807)	Bleg bregnetæge	1	
<i>Monalocoris filicis</i>	(Linnaeus, 1758)	Mørk bregnetæge	2	
Tribus DICYPHINI (11)				
<i>Campyloneura virgula</i>	(Herrich-Schaeffer, 1835)		3	
<i>Dicyphus annulatus</i>	(Wolff, 1804)		4	Ny
<i>Dicyphus constrictus</i>	(Boheman, 1852)		5	

<i>Dicyphus epilobii</i>	Reuter, 1883	Dueurtblomstertæge	6	
<i>Dicyphus errans</i>	(Wolff, 1804)		7	Ny
<i>Dicyphus globulifer</i>	(Fallén, 1829)		8	
<i>Dicyphus pallicornis</i>	(Fieber, 1861)	Fingerbølblomstertæge	9	
<i>Dicyphus pallidus</i>	(Herrich-Schaeffer, 1836)		10	
<i>Dicyphus stachydis</i>	J. Sahlberg, 1878		11	
<i>Macrolophus pygmaeus</i>	(Rambur, 1839)		12	Syn.
<i>Tupiocoris rhododendri</i>	(Dolling, 1972)		13	Ny
Underfamilie DERAEOCORINAE (7)				
Tribus CLIVINEMINI (1)				
<i>Bothynotus pilosus</i>	(Boheman, 1852)		14	
Tribus DERAEOCORINI (6)				
<i>Alloeotomus gothicus</i>	(Fallén, 1807)		15	
<i>Deraeocoris flavilinea</i>	(A. Costa, 1862)		16	Ny
<i>Deraeocoris lutescens</i>	(Schilling, 1837)		17	
<i>Deraeocoris punctulatus</i>	(Fallén, 1807)		18	
<i>Deraeocoris ruber</i>	(Linnaeus, 1758)		20	
<i>Deraeocoris scutellaris</i>	(Fabricius, 1794)		19	
Underfamilie MIRINAE (82)				
Tribus MIRINI (62)				
<i>Adelphocoris lineolatus</i>	(Goeze, 1778)	Lucernetæge	21	
<i>Adelphocoris quadripunctatus</i>	(Fabricius, 1794)		22	Syn.
<i>Adelphocoris seticornis</i>	(Fabricius, 1775)	Pileblomstertæge	23	
<i>Adelphocoris ticinensis</i>	(Meyer-Dür, 1843)		25	Ny
<i>Agnocoris rubicundus</i>	(Fallén, 1807)		24	
<i>Apolygus limbatus</i>	(Fallén, 1807)		26	Syn.
<i>Apolygus lucorum</i>	(Meyer-Dür, 1843)		27	Syn.
<i>Apolygus rhamnicola</i>	(Reuter, 1885)		28	Ny
<i>Apolygus spinolae</i>	(Meyer-Dür, 1841)		29	Syn.
<i>Calocoris affinis</i>	(Herrich-Schaeffer, 1835)		30	
<i>Calocoris alpestris</i>	(Meyer-Dür, 1843)		31	
<i>Calocoris roseomaculatus</i>	(De Geer, 1773)	Rølliketæge	32	
<i>Camptozygum aequale</i>	(Villers, 1789)		33	
<i>Capsodes gothicus</i>	(Linnaeus, 1758)	Gulrandet blomstertæge	34	
<i>Capsus ater</i>	(Linnaeus, 1758)	Sort blomstertæge	35	
<i>Capsus pilifer</i>	(Remane, 1950)		36	Ny
<i>Capsus wagneri</i>	(Remane, 1950)		37	
<i>Charagochilus gyllenhalii</i>	(Fallén, 1807)		38	
<i>Closterotomus biclavatus</i>	(Herrich-Schaeffer, 1835)		39	Syn.
<i>Closterotomus fulvomaculatus</i>	(De Geer, 1773)		40	Syn.
<i>Closterotomus norwegicus</i>	(Gmelin, 1790)	Toplettet bederoetæge	41	Syn.
<i>Dichrooscytus gustavi</i>	Josifov, 1981		42	Ny
<i>Dichrooscytus intermedius</i>	Reuter, 1885		43	
<i>Dichrooscytus rufipennis</i>	(Fallén, 1807)		44	
<i>Grypocoris sexguttatus</i>	(Fabricius, 1777)	Sekspletet blomstertæge	45	Syn.
<i>Liocoris tripustulatus</i>	(Fabricius, 1781)	Trepletet nældetæge	46	
<i>Lygocoris pabulinus</i>	(Linnaeus, 1761)	Havetæge	47	Syn.
<i>Lygocoris rugicollis</i>	(Fallén, 1807)	Æbletæge	48	Syn.
<i>Lygus gemellatus</i>	(Herrich-Schaeffer, 1835)		49	Syn.
<i>Lygus maritimus</i>	Wagner, 1949	Strandengtæge	50	Syn.
<i>Lygus pratensis</i>	(Linnaeus, 1758)	Almindelig engtæge	51	Syn.
<i>Lygus rugulipennis</i>	Poppius, 1911	Håret engtæge	52	Syn.
<i>Lygus wagneri</i>	Remane, 1955		53	Syn.
<i>Megacoelum beckeri</i>	(Fieber, 1870)		54	Ny
<i>Megacoelum infusum</i>	(Herrich-Schaeffer, 1837)		55	

<i>Mermitelocerus schmidtii</i>	(Fieber, 1836)		57	Syn.
<i>Miris striatus</i>	(Linnaeus, 1758)	Gulstribet egetæge	58	
<i>Neolygus contaminatus</i>	(Fallén, 1807)	Birkeblomstertæge	56	Syn.
<i>Neolygus viridis</i>	(Fallén, 1807)	Parktæge	59	Syn.
<i>Orthops basalıs</i>	(A. Costa, 1853)		60	
<i>Orthops campestris</i>	(Linnaeus, 1758)	Skærmpantetæge	61	
<i>Orthops kalmii</i>	(Linnaeus, 1758)	Selleritæge	62	
<i>Pantilius tunicatus</i>	(Fabricius, 1781)	Stor hasseltæge	63	
<i>Phytocoris dimidiatus</i>	Kirschbaum, 1856		64	
<i>Phytocoris intricatus</i>	Flor, 1861		65	
<i>Phytocoris longipennis</i>	Flor, 1861		66	
<i>Phytocoris pini</i>	Kirschbaum, 1856		67	
<i>Phytocoris populi</i>	(Linnaeus, 1758)		68	
<i>Phytocoris reuteri</i>	Saunders, 1876		69	
<i>Phytocoris tiliae</i>	(Fabricius, 1777)		70	
<i>Phytocoris ulmi</i>	(Linnaeus, 1758)		71	
<i>Phytocoris varipes</i>	Boheman, 1852		72	
<i>Pinalitus atomarius</i>	(Meyer-Dür, 1843)		73	Syn.
<i>Pinalitus cervinus</i>	(Herrich-Schaeffer, 1841)		74	Syn.
<i>Pinalitus rubricatus</i>	(Fallén, 1807)		75	Syn.
<i>Polymerus brevicornis</i>	(Reuter, 1879)		76	
<i>Polymerus nigrita</i>	(Fallén, 1807)		77	
<i>Polymerus palustris</i>	(Reuter, 1907)		78	
<i>Polymerus unifasciatus</i>	(Fabricius, 1794)	Gulhåret blomstertæge	79	
<i>Polymerus vulneratus</i>	(Panzer, 1806)		80	
<i>Rhabdomiris striatellus</i>	(Fabricius, 1794)		82	Syn.
<i>Stenotus binotatus</i>	(Fabricius, 1794)		81	
Tribus STENODEMINI (20)				
<i>Acetropis carinata</i>	(Herrich-Schaeffer, 1841)		83	
<i>Acetropis gimmerthalii</i>	(Flor, 1860)		84	
<i>Leptopterna dolabrata</i>	(Linnaeus, 1758)	Almindelig græstæge	85	
<i>Leptopterna ferrugata</i>	(Fallén, 1807)	Rødbrun græstæge	86	
<i>Megaloceroea relicticornis</i>	(Geoffroy, 1785)		87	
<i>Myrmecoris gracilis</i>	(R.F. Sahlberg, 1848)	Myregræstæge	88	
<i>Notostira elongata</i>	(Geoffroy, 1785)	Tofaset græstæge	90	
<i>Notostira erratica</i>	(Linnaeus, 1758)		89	
<i>Pithanus maerkelii</i>	(Herrich-Schaeffer, 1838)	Sort græstæge	91	
<i>Stenodema calcarata</i>	(Fallén, 1807)	Tornet græstæge	92	
<i>Stenodema holsata</i>	(Fabricius, 1787)	Skovgræstæge	93	
<i>Stenodema laevigata</i>	(Linnaeus, 1758)	Slank græstæge	94	
<i>Stenodema trispinosa</i>	Reuter, 1904	Tornet græstæge	95	
<i>Stenodema virens</i>	(Linnaeus, 1767)		96	
<i>Teratocoris antennatus</i>	(Boheman, 1852)		98	
<i>Teratocoris paludum</i>	J. Sahlberg, 1870		97	
<i>Teratocoris saundersi</i>	(Douglas & Scott, 1869)	Strandgræstæge	99	
<i>Trigonotylus caelestialium</i>	(Kirkaldy, 1902)		100	
<i>Trigonotylus psammaecolor</i>	Reuter, 1885		101	Syn.
<i>Trigonotylus ruficornis</i>	(Geoffroy, 1785)	Rødhornet græstæge	102	
Underfamilie ORTHOTYLINAE (40)				
Tribus HALTICINI (7)				
<i>Halticus apterus</i>	(Linnaeus, 1758)	Kløvertæge	103	
<i>Halticus luteicollis</i>	(Panzer, 1804)		104	
<i>Orthocephalus coriaceus</i>	(Fabricius, 1777)		105	
<i>Orthocephalus saltator</i>	(Hahn, 1835)		106	
<i>Strongylocoris leucocephalus</i>	(Linnaeus, 1758)		107	

<i>Strongylocoris luridus</i>	(Fallén, 1807)		108	
<i>Strongylocoris steganoideus</i>	(J. Sahlberg, 1875)		109	Ny
Tribus ORTHOTYLINI (33)				
<i>Blepharidopterus angulatus</i>	(Fallén, 1807)	Sortknæet blomstertæge	110	
<i>Blepharidopterus diaphanus</i>	(Kirschbaum, 1856)		111	Syn.
<i>Cyllecoris histrionius</i>	(Linnaeus, 1767)		113	
<i>Cyrtorhinus caricis</i>	(Fallén, 1807)		112	
<i>Dryophilocoris flavoquadrinaculatus</i>	(De Geer, 1773)	Fireplettet blomstertæge	114	
<i>Fieberocapsus flaveolus</i>	(Reuter, 1870)		115	
<i>Globiceps flavomaculatus</i>	(Fabricius, 1794)		116	
<i>Globiceps fulvicollis</i>	Jakovlev, 1877		117	
<i>Heterocordylus genistae</i>	(Scopoli, 1763)		118	
<i>Heterocordylus leptocerus</i>	(Kirschbaum, 1856)		119	
<i>Heterocordylus tibialis</i>	(Hahn, 1833)		120	
<i>Heterocordylus tumidicornis</i>	(Herrich-Schaeffer, 1835)		121	
<i>Heterotoma planicornis</i>	(Pallas, 1772)	Køllehornet blomstertæge	122	
<i>Malacocoris chlorizans</i>	(Panzer, 1794)	Sart hasseltæge	123	
<i>Mecomma ambulans</i>	(Fallén, 1807)		124	
<i>Orthotylus adenocarpus</i>	(Perris, 1857)		125	Ny
<i>Orthotylus bilineatus</i>	(Fallén, 1807)		126	
<i>Orthotylus concolor</i>	(Kirschbaum, 1856)		127	
<i>Orthotylus ericetorum</i>	(Fallén, 1807)	Lyngblomstertæge	128	
<i>Orthotylus flavinervis</i>	(Kirschbaum, 1856)		129	
<i>Orthotylus flavosparsus</i>	(C.R. Sahlberg, 1841)	Salturtblomstertæge	130	
<i>Orthotylus fuscescens</i>	(Kirschbaum, 1856)		131	
<i>Orthotylus marginalis</i>	Reuter, 1883		132	
<i>Orthotylus moncreaffi</i>	(Douglas & Scott, 1874)		133	
<i>Orthotylus nassatus</i>	(Fabricius, 1787)		134	
<i>Orthotylus prasinus</i>	(Fallén, 1826)		135	
<i>Orthotylus rubidus</i>	(Puton, 1874)		136	Ny
<i>Orthotylus tenellus</i>	(Fallén, 1807)		137	
<i>Orthotylus virens</i>	(Fallén, 1807)		138	
<i>Orthotylus virescens</i>	(Douglas & Scott, 1865)	Gyvelblomstertæge	139	
<i>Orthotylus viridinervis</i>	(Kirschbaum, 1856)	Elmeblomstertæge	140	
<i>Pseudoloxops coccineus</i>	(Meyer-Dür, 1843)		141	
<i>Reuteria marqueti</i>	Puton, 1875		142	Ny
Underfamilie PHYLINEAE (70)				
Tribus PILOPHORINI (4)				
<i>Pilophorus cinnamopterus</i>	(Kirschbaum, 1856)		143	
<i>Pilophorus clavatus</i>	(Linnaeus, 1767)		144	
<i>Pilophorus confusus</i>	(Kirschbaum, 1856)		145	
<i>Pilophorus perplexus</i>	Douglas & Scott, 1875		146	
Tribus HALLODAPINI (2)				
<i>Hallodapus rufescens</i>	(Burmeister, 1835)		147	
<i>Systellonotus triguttatus</i>	(Linnaeus, 1767)		148	
Tribus PHYLINI (64)				
<i>Amblytylus albidus</i>	(Hahn, 1834)		149	
<i>Amblytylus brevicollis</i>	Fieber, 1858		150	
<i>Amblytylus delicatus</i>	(Perris, 1857)		151	Ny
<i>Amblytylus nasutus</i>	(Kirschbaum, 1856)		152	
<i>Asciodema obsoleta</i>	(Fieber, 1864)		153	
<i>Atractotomus kolenatii</i>	(Flor, 1860)		154	Syn.
<i>Atractotomus magnicornis</i>	(Fallén, 1807)		155	
<i>Atractotomus mali</i>	(Meyer-Dür, 1843)		156	
<i>Brachyarthrum limitatum</i>	Fieber, 1858		157	

<i>Campylomma annulicorne</i>	(Signoret, 1865)		158	Ny
<i>Campylomma verbasci</i>	(Meyer-Dür, 1843)		159	Ny
<i>Chlamydatus pulicarius</i>	(Fallén, 1807)	Græsplænetæge	160	
<i>Chlamydatus pullus</i>	(Reuter, 1870)		161	
<i>Chlamydatus saltitans</i>	(Fallén, 1807)		162	
<i>Compsidolon salicellum</i>	(Herrich-Schaeffer, 1841)		163	
<i>Conostethus griseus</i>	Douglas & Scott, 1870		164	Syn.
<i>Conostethus roseus</i>	(Fallén, 1807)		165	
<i>Criocoris crassicornis</i>	(Hahn, 1834)		166	
<i>Europiella albipennis</i>	(Fallén, 1829)		167	Ny
<i>Europiella artemisiae</i>	(Becker, 1864)		168	Syn.
<i>Europiella decolor</i>	(Uhler, 1893)		169	Syn.
<i>Harpocera thoracica</i>	(Fallén, 1807)		170	
<i>Hoplomachus thunbergii</i>	(Fallén, 1807)		171	
<i>Lopus decolor</i>	(Fallén, 1807)		172	
<i>Macrotylus paykullii</i>	(Fallén, 1807)		173	
<i>Macrotylus solitarius</i>	(Meyer-Dür, 1843)		174	
<i>Megalocoleus molliculus</i>	(Fallén, 1807)		175	
<i>Megalocoleus tanacetii</i>	(Fallén, 1807)		176	Syn.
<i>Monosynamma bohemanni</i>	(Fallén, 1829)		177	
<i>Monosynamma maritimum</i>	(Wagner, 1947)		178	
<i>Oncotylus punctipes</i>	Reuter, 1875		179	
<i>Orthonotus rufifrons</i>	(Fallén, 1807)	Rødhovedet blomstertæge	180	
<i>Parapsallus vitellinus</i>	(Scholtz, 1847)		181	Syn.
<i>Phoenicocoris dissimilis</i>	(Reuter, 1878)		182	
<i>Phoenicocoris obscurellus</i>	(Fallén, 1829)		183	
<i>Phylus coryli</i>	(Linnaeus, 1758)		184	
<i>Phylus melanocephalus</i>	(Linnaeus, 1767)	Egeblomstertæge	185	
<i>Placochilus seladonicus</i>	(Fallén, 1807)		187	
<i>Plagiognathus arbustorum</i>	(Fabricius, 1794)	Almindelig nældeblomstertæge	186	
<i>Plagiognathus chrysanthemi</i>	(Wolff, 1804)		188	
<i>Plesiodema pinetella</i>	(Zetterstedt, 1828)		189	
<i>Psallodema fieberi</i>	(Fieber, 1864)		190	Syn.
<i>Psallus albicinctus</i>	(Kirschbaum, 1856)		191	
<i>Psallus ambiguus</i>	(Fallén, 1807)		192	
<i>Psallus assimilis</i>	Stichel, 1956		193	Ny
<i>Psallus betuleti</i>	(Fallén, 1826)		194	
<i>Psallus confusus</i>	Rieger, 1981		195	
<i>Psallus falleni</i>	Reuter, 1883		196	
<i>Psallus flavellus</i>	Stichel, 1933		197	
<i>Psallus haematodes</i>	(Gmelin, 1790)		198	
<i>Psallus lepidus</i>	Fieber, 1858		199	
<i>Psallus luridus</i>	Reuter, 1878		200	
<i>Psallus mollis</i>	(Mulsant & Rey, 1852)		201	
<i>Psallus perrisi</i>	(Mulsant & Rey, 1852)		202	
<i>Psallus pseudoplatani</i>	Reichling, 1984		203	Ny
<i>Psallus quercus</i>	(Kirschbaum, 1856)		204	
<i>Psallus salicis</i>	(Kirschbaum, 1856)		205	Syn.
<i>Psallus variabilis</i>	(Fallén, 1807)		206	
<i>Psallus varians</i>	(Herrich-Schaeffer, 1841)		207	
<i>Psallus wagneri</i>	Ossiannilsson, 1953		208	
<i>Salicarus roseri</i>	(Herrich-Schaeffer, 1838)		209	Ny
<i>Sthenarus rotermundi</i>	(Scholtz, 1847)		210	
<i>Tytthus pubescens</i>	(Knight, 1931)		211	Syn.
<i>Tytthus pygmaeus</i>	(Zetterstedt, 1838)		212	



Familie NABIDAE (13)		NYMFETÆGER	
<i>Himacerus apterus</i>	(Fabricius, 1798)	Stor nymfetæge	
<i>Himacerus boops</i>	(Schlødte, 1870)	Storøjet nymfetæge	#10 Syn.
<i>Himacerus major</i>	(A. Costa, 1842)	Klitnymfetæge	#11 Syn.
<i>Himacerus mimicoides</i>	(O. Costa, 1834)	Myrenymfetæge	#12 Syn.
<i>Nabis brevis</i>	Scholtz, 1847		
<i>Nabis ericetorum</i>	Scholtz, 1847	Lyngnymfetæge	
<i>Nabis ferus</i>	(Linnaeus, 1758)	Almindelig nymfetæge	
<i>Nabis flavomarginatus</i>	Scholtz, 1847	Kortvinget nymfetæge	
<i>Nabis limbatus</i>	Dahlbom, 1851	Bred nymfetæge	#13 Syn.
<i>Nabis lineatus</i>	Dahlbom, 1851	Lang nymfetæge	#14 Syn.
<i>Nabis pseudoferus</i>	Remane, 1949	Almindelig nymfetæge	
<i>Nabis punctatus</i>	A. Costa, 1847		#15 Syn.
<i>Nabis rugosus</i>	(Linnaeus, 1758)		
Familie ANTHOCORIDAE (29)		BLADLUSTÆGER	
<i>Acompocoris alpinus</i>	Reuter, 1875		
<i>Acompocoris pygmaeus</i>	(Fallén, 1807)		
<i>Anthocoris amplicollis</i>	Horváth, 1893		
<i>Anthocoris butleri</i>	Le Quesne, 1954		#16 Ny
<i>Anthocoris confusus</i>	Reuter, 1884		
<i>Anthocoris gallarumulmi</i>	(De Geer, 1773)	Elmegallebladlustæge	
<i>Anthocoris limbatus</i>	Fieber, 1836		#17 Ny
<i>Anthocoris nemoralis</i>	(Fabricius, 1794)		
<i>Anthocoris nemorum</i>	(Linnaeus, 1761)	Skinnende bladlustæge	
<i>Anthocoris sarothamni</i>	Douglas & Scott, 1865		#18 Ny
<i>Anthocoris simulans</i>	Reuter, 1884		
<i>Brachysteles parvicornis</i>	(A. Costa, 1847)		
<i>Dufouriellus ater</i>	(Dufour, 1833)		
<i>Elatophilus stigmatellus</i>	(Zetterstedt, 1838)		
<i>Lyctocoris campestris</i>	(Fabricius, 1794)	Redetæge	
<i>Orius horvathi</i>	(Reuter, 1884)		
<i>Orius laticollis</i>	(Reuter, 1884)		
<i>Orius majusculus</i>	(Reuter, 1879)		
<i>Orius minutus</i>	(Linnaeus, 1758)		
<i>Orius niger</i>	(Wolff, 1811)		
<i>Orius vicinus</i>	(Ribaut, 1923)		
<i>Scoloposcelis pulchella</i>	(Zetterstedt, 1838)		
<i>Temnostethus gracilis</i>	Horváth, 1907		
<i>Temnostethus pusillus</i>	(Herrich-Schaeffer, 1835)		
<i>Tetraphleps bicuspis</i>	(Herrich-Schaeffer, 1835)		
<i>Xylocoris cursitans</i>	(Fallén, 1807)		
<i>Xylocoris formicetorum</i>	(Boheman, 1844)		
<i>Xylocoris galactinus</i>	(Fieber, 1836)		
<i>Xylocoris lativentris</i>	(J. Sahlberg, 1870)		
Familie CIMICIDAE (4)		VÆGGELUS	
<i>Cimex columbarius</i>	Jenyns, 1839	Duevæggelus	#19 Ny
<i>Cimex dissimilis</i>	(Horváth, 1910)	Flagermusevæggelus	
<i>Cimex lectularius</i>	Linnaeus, 1758	Væggelus	
<i>Oeciacus hirundinis</i>	(Lamarck, 1816)	Svælevæggelus	
Familie REDUVIIDAE (8)		ROVTÆGER	
<i>Coranus aethiops</i>	Jakovlev, 1893	Sort rovtæge	#20 Ny
<i>Coranus subapterus</i>	(De Geer, 1773)	Grå rovtæge	
<i>Coranus woodroffe</i>	P.V. Putshkov, 1982	Mørkgrå rovtæge	#21 Ny
<i>Empicoris culiciformis</i>	(De Geer, 1773)	Lille myggetæge	
<i>Empicoris vagabundus</i>	(Linnaeus, 1758)	Stor myggetæge	

<i>Pygolampis bidentata</i>	(Goeze, 1778)	Tandet rovtæge		
<i>Reduvius personatus</i>	(Linnaeus, 1758)	Skarntæge		
<i>Rhynocoris annulatus</i>	(Linnaeus, 1758)	Rødringet rovtæge		
Familie ARADIDAE (11)		BARKTÆGER		
<i>Aneurus avenius</i>	(Dufour, 1833)	Flad risgærdetæge	#22	Fam.
<i>Aneurus laevis</i>	(Fabricius, 1775)	Puklet risgærdetæge	#22	Fam.
<i>Aradus betulae</i>	(Linnaeus, 1758)	Birkebarktæge		
<i>Aradus betulinus</i>	Fallén, 1807	Mørk barktæge	#23	Ny
<i>Aradus brenskei</i>	Reuter, 1884	Langsnablet barktæge		
<i>Aradus brevicollis</i>	Fallén, 1807	Bjergbarktæge	#24	Ny
<i>Aradus cinnamomeus</i>	Panzer, 1806	Fyrrebarktæge		
<i>Aradus conspicuus</i>	Herrich-Schaeffer, 1835	Stor barktæge	#25	Syn.
<i>Aradus corticalis</i>	(Linnaeus, 1758)	Skyggebarktæge		
<i>Aradus depressus</i>	(Fabricius, 1794)	Almindelig barktæge		
<i>Aradus truncatus</i>	Fieber, 1860	Poppelbarktæge		
Familie LYGAEIDAE (71)		FRØTÆGER		
<i>Acompus rufipes</i>	(Wolff, 1804)	Baldrianfrøtæge		
<i>Aphanus rolandri</i>	(Linnaeus, 1758)		#26	Ny
<i>Chilacis typhae</i>	(Perris, 1857)	Dunhammertæge		
<i>Cymus aurescens</i>	Distant, 1883		#27	Ny
<i>Cymus clavicularis</i>	(Fallén, 1807)			
<i>Cymus glandicolor</i>	Hahn, 1832	Starfrøtæge		
<i>Cymus melanocephalus</i>	Fieber, 1861		#28	Ny
<i>Dimorphopterus spinolae</i>	(Signoret, 1857)			
<i>Drymus brunneus</i>	(R.F. Sahlberg, 1848)			
<i>Drymus ryei</i>	Douglas & Scott, 1865			
<i>Drymus sylvaticus</i>	(Fabricius, 1775)	Skovfrøtæge		
<i>Emblethis denticollis</i>	Horváth, 1878		#29	Ny
<i>Eremocoris abietis</i>	(Linnaeus, 1758)			
<i>Eremocoris plebejus</i>	(Fallén, 1807)			
<i>Gastrodes abietum</i>	Bergroth, 1914	Grankogletæge		
<i>Gastrodes grossipes</i>	(De Geer, 1773)	Fyrrekogletæge		
<i>Geocoris ater</i>	(Fabricius, 1787)	Storøjet frøtæge		
<i>Geocoris grylloides</i>	(Linnaeus, 1761)			
<i>Gonianotus marginepunctatus</i>	(Wolff, 1804)			
<i>Graptopeltus lynceus</i>	(Fabricius, 1775)			
<i>Heterogaster urticae</i>	(Fabricius, 1775)	Nældefrøtæge		
<i>Ischnocoris angustulus</i>	(Boheman, 1852)			
<i>Ischnodemus sabuleti</i>	(Fallén, 1826)	Smaltæge		
<i>Kleidocerys resedae</i>	(Panzer, 1797)	Birkefrøtæge		
<i>Lamproplax picea</i>	(Flor, 1860)			
<i>Lasiosomus enervis</i>	(Herrich-Schaeffer, 1835)			
<i>Ligyrocorys sylvestris</i>	(Linnaeus, 1758)			
<i>Lygaeus equestris</i>	(Linnaeus, 1758)	Soldatertæge		
<i>Macrodera microptera</i>	(Curtis, 1836)			
<i>Megalonotus antennatus</i>	(Schilling, 1829)			
<i>Megalonotus chiragra</i>	(Fabricius, 1794)	Klitfrøtæge		
<i>Megalonotus dilatatus</i>	(Herrich-Schaeffer, 1840)			
<i>Megalonotus praetextatus</i>	(Herrich-Schaeffer, 1835)			
<i>Nysius ericae</i>	(Schilling, 1829)			
<i>Nysius helveticus</i>	(Herrich-Schaeffer, 1850)			
<i>Nysius senecionis</i>	(Schilling, 1829)			
<i>Nysius thymi</i>	(Wolff, 1804)	Timianfrøtæge		
<i>Orsillus depressus</i>	(Mulsant & Rey, 1852)		#30	Ny
<i>Ortholomus punctipennis</i>	(Herrich-Schaeffer, 1838)			

<i>Pachybrachius fracticollis</i>	(Schilling, 1829)		
<i>Pachybrachius luridus</i>	Hahn, 1826		
<i>Peritrechus angusticollis</i>	(R.F. Sahlberg, 1848)		
<i>Peritrechus convivus</i>	(Stål, 1858)	#31	Syn.
<i>Peritrechus geniculatus</i>	(Hahn, 1832)		
<i>Peritrechus lundii</i>	(Gmelin, 1790)		
<i>Peritrechus nubilus</i>	(Fallén, 1807)		
<i>Pionosomus opacellus</i>	Horváth, 1895		
<i>Pionosomus varius</i>	(Wolff, 1804)	Håret frøtæge	
<i>Plinthisus brevipennis</i>	(Latreille, 1807)		
<i>Plinthisus pusillus</i>	(Scholtz, 1847)		
<i>Pterotmetus staphyliniformis</i>	(Schilling, 1829)		
<i>Raglius alboacuminatus</i>	(Goeze, 1778)		
<i>Rhyparochromus phoeniceus</i>	(Rossi, 1794)		
<i>Rhyparochromus pini</i>	(Linnaeus, 1758)	Stor frøtæge	
<i>Rhyparochromus vulgaris</i>	(Schilling, 1829)		#32 Ny
<i>Scolopostethus affinis</i>	(Schilling, 1829)	Jordbærfrøtæge	
<i>Scolopostethus decoratus</i>	(Hahn, 1833)		
<i>Scolopostethus grandis</i>	Horváth, 1880		#33 Ny
<i>Scolopostethus pilosus</i>	Reuter, 1875		
<i>Scolopostethus puberulus</i>	Horváth, 1887		#34 Ny
<i>Scolopostethus thomsoni</i>	Reuter, 1875	Jordbærfrøtæge	
<i>Sphragisticus nebulosus</i>	(Fallén, 1807)		
<i>Stygnocoris fuliginus</i>	(Geoffroy, 1785)		
<i>Stygnocoris rusticus</i>	(Fallén, 1807)		
<i>Stygnocoris sabulosus</i>	(Schilling, 1829)	Brun frøtæge	
<i>Trapezonotus anorus</i>	(Flor, 1860)		
<i>Trapezonotus arenarius</i>	(Linnaeus, 1758)	Sandfrøtæge	
<i>Trapezonotus desertus</i>	Seidenstücker, 1951		
<i>Trapezonotus dispar</i>	Stål, 1872		
<i>Tropistethus holosericus</i>	(Scholtz, 1846)		
<i>Xanthochilus quadratus</i>	(Fabricius, 1798)		
Familie PIESMATIDAE (5)			
<i>Parapiesma quadratum</i>	(Fieber, 1844)	Mældetæge	
<i>Parapiesma salsolae</i>	(Becker, 1867)		#35 Ny
<i>Parapiesma variabile</i>	(Fieber, 1844)		
<i>Piesma capitatum</i>	(Wolff, 1804)		
<i>Piesma maculatum</i>	(Laporte, 1833)		
Familie BERYTIDAE (8)		STYLTETÆGER	
<i>Berytinus clavipes</i>	(Fabricius, 1775)		
<i>Berytinus crassipes</i>	(Herrich-Schaeffer, 1835)	Lille styltetæge	
<i>Berytinus minor</i>	(Herrich-Schaeffer, 1835)	Lille styltetæge	
<i>Berytinus montivagus</i>	(Meyer-Dür, 1841)		
<i>Berytinus signoreti</i>	(Fieber, 1859)		
<i>Gampsocoris punctipes</i>	(Germar, 1822)	Krageklotæge	#36 Syn.
<i>Metatropis rufescens</i>	(Herrich-Schaeffer, 1835)	Steffensurtæge	
<i>Neides tipularius</i>	(Linnaeus, 1758)	Stor styltetæge	
Familie PYRRHOCORIDAE (1)		ILDTÆGER	
<i>Pyrrhocoris apterus</i>	(Linnaeus, 1758)	Ildtæge	
Familie ALYDIDAE (1)		HVEPSETÆGER	
<i>Alydus calcaratus</i>	(Linnaeus, 1758)	Hvepsetæge	
Familie COREIDAE (10)		RANDTÆGER	
<i>Arenocoris fallenii</i>	(Schilling, 1829)	Rynket randtæge	
<i>Bathysolen nubilus</i>	(Fallén, 1807)	Lille randtæge	
<i>Ceraleptus lividus</i>	Stein, 1858	Glat randtæge	

<i>Coreus marginatus</i>	(Linnaeus, 1758)	Skræppetæge		
<i>Coriomeris denticulatus</i>	(Scopoli, 1763)	Langtornet randtæge		
<i>Coriomeris scabricornis</i>	(Panzer, 1809)	Fintornet randtæge		
<i>Gonocerus acuteangulatus</i>	(Goeze, 1778)		#37	Ny
<i>Leptoglossus occidentalis</i>	Heidemann, 1910		#38	Ny
<i>Spathocera dalmanii</i>	(Schilling, 1829)	Rødknærandtæge		
<i>Syromastus rhombeus</i>	(Linnaeus, 1767)	Rudetæge		
Familie RHOPALIDAE (10)		KANTTÆGER		
<i>Brachycarenum tigrinus</i>	(Schilling, 1829)	Bleg kanttæge	#39	Syn.
<i>Chorosoma schillingii</i>	(Schilling, 1829)	Lang stråtæge		
<i>Corizus hyoscyami</i>	(Linnaeus, 1758)	Rød kanttæge		
<i>Liorhyssus hyalinus</i>	(Fabricius, 1794)		#40	Ny
<i>Myrmus miriformis</i>	(Fallén, 1807)	Lille stråtæge		
<i>Rhopalus maculatus</i>	(Fieber, 1837)	Mosekanttæge		
<i>Rhopalus parumpunctatus</i>	Schilling, 1829	Almindelig kanttæge		
<i>Rhopalus subrufus</i>	(Gmelin, 1790)	Skovkanttæge		
<i>Stictopleurus abutilon</i>	(Rossi, 1790)	Tørkekanttæge	#41	Ny
<i>Stictopleurus crassicornis</i>	(Linnaeus, 1758)	Bjergkanttæge		
Familie CYDNIDAE (6)		TORNBEN		
<i>Adomerus biguttatus</i>	(Linnaeus, 1758)	Toplettet tornben		
<i>Legnotus limbosus</i>	(Geoffroy, 1785)	Hvidrandet tornben		
<i>Legnotus picipes</i>	(Fallén, 1807)	Lille tornben		
<i>Sehirus luctuosus</i>	Mulsant & Rey, 1866	Mørk tornben		
<i>Sehirus morio</i>	(Linnaeus, 1761)	Stor tornben		
<i>Tritomegas bicolor</i>	(Linnaeus, 1758)	Spættet tornben		
Familie THYREOCORIDAE (1)				
<i>Thyreocoris scarabaeoides</i>	(Linnaeus, 1758)	Blank tornben	#42	Fam.
Familie SCUTELLERIDAE (6)		SKJOLDTÆGER		
<i>Eurygaster austriaca</i>	(Schrank, 1776)	Stor skjoldtæge		
<i>Eurygaster maura</i>	(Linnaeus, 1758)	Græsskjoldtæge		
<i>Eurygaster testudinaria</i>	(Geoffroy, 1785)	Starskjoldtæge		
<i>Odontoscelis fuliginosa</i>	(Linnaeus, 1761)	Stor sandtæge		
<i>Odontoscelis lineola</i>	Rambur, 1839	Lille sandtæge		
<i>Phimodera humeralis</i>	(Dalman, 1823)	Klitsandtæge		
Familie PENTATOMIDAE (30)		EGENTLIGE BREDTÆGER		
<i>Aelia acuminata</i>	(Linnaeus, 1758)	Almindelig bispetæge		
<i>Aelia klugii</i>	Hahn, 1833	Lille bispetæge		
<i>Aelia rostrata</i>	Boheman, 1852	Stor bispetæge		
<i>Arma custos</i>	(Fabricius, 1794)	Kustodetæge	#43	Ny
<i>Carpocoris fuscispinus</i>	(Boheman, 1851)	Glat bredtæge		
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	(De Geer, 1773)	Purpurbredtæge	#44	Ny
<i>Chlorochroa juniperina</i>	(Linnaeus, 1758)	Enebærbredtæge	#45	Syn.
<i>Chlorochroa pinicola</i>	(Mulsant & Rey, 1852)	Fyrrebredtæge	#46	Syn.
<i>Dolycoris baccarum</i>	(Linnaeus, 1758)	Almindelig bærtæge		
<i>Eurydema dominulus</i>	(Scopoli, 1763)	Karsetæge		
<i>Eurydema oleracea</i>	(Linnaeus, 1758)	Almindelig kåltæge		
<i>Eurydema ornata</i>	(Linnaeus, 1758)	Rød kåltæge		
<i>Eysarcoris venustissimus</i>	(Schrank, 1776)	Gylden urtetæge	#47	Syn.
<i>Graphosoma lineatum</i>	(Linnaeus, 1758)	Stribetæge	#48	Ny
<i>Holcostethus strictus</i>	(Wolff, 1804)	Lille bærtæge	#49	Syn.
<i>Jalla dumosa</i>	(Linnaeus, 1758)	Stregetæge		
<i>Neottiglossa pusilla</i>	(Gmelin, 1790)	Præstetæge		
<i>Palomena prasina</i>	(Linnaeus, 1761)	Grøn bredtæge		
<i>Pentatoma rufipes</i>	(Linnaeus, 1758)	Rødbenet bredtæge		
<i>Picromerus bidens</i>	(Linnaeus, 1758)	Tørntæge		

<i>Piezodorus lituratus</i>	(Fabricius, 1794)	Gyvelbredtæge	#50	Ny
<i>Pinthaeus sanguinipes</i>	(Fabricius, 1781)	Stor bredtæge		
<i>Podops inunctus</i>	(Fabricius, 1775)	Krogtæge		
<i>Rhacognathus punctatus</i>	(Linnaeus, 1758)	Mosebredtæge		
<i>Sciocoris cursitans</i>	(Fabricius, 1794)	Lille kransstæge		
<i>Sciocoris homalonotus</i>	Fieber, 1851	Stor kransstæge	#51	Ny
<i>Sciocoris macrocephalus</i>	Fieber, 1851	Stilkøjet kransstæge		
<i>Stagonomus bipunctatus</i>	(Linnaeus, 1758)	Toplettet urtetæge	#52	Syn.
<i>Troilus luridus</i>	(Fabricius, 1775)	Skovbredtæge		
<i>Zicrona caerulea</i>	(Linnaeus, 1758)	Blå bredtæge		
Familie ACANTHOSOMATIDAE (8)		LØVTÆGER		
<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i>	(Linnaeus, 1758)	Stor løvtæge		
<i>Cyphostethus tristriatus</i>	(Fabricius, 1787)	Slank enebærtæge		
<i>Elasmotethus brevis</i>	Lindberg, 1934	Pilebredtæge	#53	Ny
<i>Elasmotethus interstinctus</i>	(Linnaeus, 1758)	Almindelig løvtæge		
<i>Elasmotethus minor</i>	Horváth, 1899		#54	Ny
<i>Elasmucha ferrugata</i>	(Fabricius, 1787)	Bølleløvtæge		
<i>Elasmucha fieberi</i>	Jakovlev, 1865	Tandet birketæge		
<i>Elasmucha grisea</i>	(Linnaeus, 1758)	Almindelig birketæge		



Picromerus bidens (torntæge), *Scolopostethus affinis* (jordbærfrøtæge), *Gampsocoris punctipes* (krageklotæge) (nymfe) og *Holcostethus strictus* (lille bærtæge) (nymfe).

Ceratocombidae

#1 *Ceratocombus coleoptratus*

Slægten *Ceratocombus* var tidligere placeret i familien Dipsocoridae.

Corixidae

#2 **Corixa affinis*

Indtil videre kun kendt fra et enkelt eksemplar fra Rømø (SJ), indsamlet i 2007. (Damgaard 2008).

#3 **Sigara iactans*

Udskilt fra *S. fallén*. Har længe været vidt udbredt i Danmark, men først erkendt som dansk art i 1994. (Damgaard & Mahler 1995; Damgaard 1997).

Notonectidae

#4 **Notonecta viridis* (brakvandsrygsvømmer)

Fundet som ny art for Danmark i distrikt SJ i 1994. Er siden fundet over hele landet. (Damgaard & Mahler 1995; Damgaard 1997).

Tingidae

#5 **Dictyonota fuliginosa*

Fundet som ny dansk art i 2001, hvor et enkelt individ blev indsamlet i opskyl på Rømø (SJ). I 2005 blev der fundet en population på gyvel ved Højer (SJ). (Bygebjerg 2005).

#6 *Kalama tricornis*

Synonym: *Dictyonota tricornis*

Microphysidae

#7 **Loricula bipunctata*

Indtil videre kun kendt fra to fund i en have i Skagen (NEJ), hhv. 1979 og 1980. Nuværende status uvis. (Enghoff 1980).

#8 *Loricula coleoptrata*

Synonym: *Myrmedobia coleoptrata*

#9 *Loricula exilis*

Synonym: *Myrmedobia exilis*



Metatropis rufescens (steffensurttæge), *Aradus depressus* (almindelig barktæge), *Nabis lineatus* (lang nymfetæge) og *Neides tipularius* (stor styltætæge).

Nabidae

#10 *Himacerus boops* (storøjet nymfetæge)
Synonym: *Stalia boops*

#11 *Himacerus major* (klitnymfetæge)
Synonym: *Stalia major*

#12 *Himacerus mirmicoides* (myrenymfetæge)
Synonym: *Aptus mirmecoides*

#13 *Nabis limbatus* (bred nymfetæge)
Synonym: *Dolichonabis limbatus*

#14 *Nabis lineatus* (lang nymfetæge)
Synonym: *Dolichonabis lineatus*

#15 *Nabis punctatus*
Synonym: *N. feroides*

Anthocoridae

#16 **Anthocoris butleri*
Fundet som ny art for Danmark i Forstbotanisk Have (NEZ) i 1978. I 1979 desuden fundet i Østre Anlæg (NEZ), hvor den blev genfundet i 2011. Ligeledes i 2011 blev den fundet på en enkelt lokalitet i distrikt F.

#17 **Anthocoris limbatus*
Kendes fra en håndfuld fund fra distrikterne SJ og EJ i perioden 1976-82. Herudover indsamlet i distrikt EJ i 2011. (Schmidt 1978).

#18 **Anthocoris sarothamni*

Fundet som ny art for Danmark i 2008, hvor den blev fundet ved Sorthat (B). I 2009 desuden fundet ved Øer (EJ). (Skipper 2009).

Cimicidae

#19 **Cimex columbarius* (duevæggelus)
Denne art er nu udskilt fra *C. lectularius* (væggelus). Begge arter forekommer i Danmark. (Hallas & Mourier 1987; Mourier 1995).

Reduviidae

#20 **Coranus aethiops* (sort rovtæge)
Udskilt fra *C. subapterus* (grå rovtæge) Lokal, men vidt udbredt i Jylland. (Tolsgaard 2005).

#21 **Coranus woodroffei* (mørkgrå rovtæge)
Indtil videre kun kendt fra et enkelt eksemplar, indsamlet på Rømø (SJ) i 1983. (Tolsgaard 2005).

Aradidae

#22 *Aneurus avenius* (flad risgærdetæge) & *Aneurus laevis* (puklet risgærdetæge)
Slægten *Aneurus* var tidligere placeret i familien Aneuridae, der nu er nedgraderet til en underfamilie i Aradidae.

#23 **Aradus betulinus* (mørk barktæge)
Endnu kun kendt fra et enkelt eksemplar taget ved Store Gribso (NEZ) i 2008. (Bjerg 2010; Tolsgaard 2011).



Lygaeus equestris (soldatertæge), *Aphelocheiris aestivalis* (dybvandstæge), *Troilus luridus* (skovbredtæge) (nymfe) og *Tritomegas bicolor* (spættet tornben).



Nepa cinerea (skorpiontæge), *Empicoris vagabundus* (stor myggetæge), *Pentatoma rufipes* (rødbenet bredtæge) og *Gastroleptus grossipes* (fyrrekogletæge) (nymfe).

#24 **Aradus brevicollis* (bjergbarktæge)

Kun kendt fra tre eksemplarer indsamlet ved Hillerød (NEZ) i 1951. Dyrene står på Zoologisk Museum i Helsinki, Finland (MZHF), og først for nylig, via den svenske tægeekspert C.-C. Coulianos, er danske entomologer blevet gjort bekendt med artens forekomst i Danmark. (Tolsgaard 2010, 2011).

#25 *Aradus conspicuus* (stor barktæge)

Synonym: *A. crenatus*

Lygaeidae

#26 **Aphanus rolandri*

Fundet som ny for Danmark ved Svanninge Bakker (F) i 2004. Er siden registreret på yderligere nogle få lokaliteter i distrikt F samt EJ. (Fugle og Natur 2008a; Skipper 2009).

#27 **Cymus aurescens*

Fundet som ny for Danmark i 1977, ved Åbenrå (SJ). Er nu vidt udbredt i det meste af landet. (Schmidt 1978).

#28 **Cymus melanocephalus*

Indtil videre kun kendt fra et enkelt eksemplar fra Fanø (WJ) indsamlet i 2009.

#29 **Emblethis denticollis*

Kun kendt fra to danske eksemplarer, indsamlet ved Slusegård (B) i 1984. (Skipper 2009).

#30 **Orsillus depressus*

Første danske fund blev gjort i Århus (EJ) i 2008. Er siden kendt fra distrikterne EJ, F og NEZ, hvor den forekommer på ædelcypres (*Chamaecyparis lawsoniana*), og muligvis andre dyrkede nåletræer, i parker, haver og på kirkegårde. (Tolsgaard 2008; Skipper 2009).

#31 *Peritrechus convivus*

Synonym: *P. distinguendus*

#32 **Rhyparochromus vulgaris*

Indtil videre kun kendt fra et enkelt eksemplar fra 2011, overvintrende i en brændestabel på Djursland (EJ).


Det kan ikke udelukkes, at der er tale om et indslæbt individ, da denne art er kendt for at spredes netop med brænde. (Fugle og Natur 2011).

#33 **Scolopostethus grandis*

Fundet som ny for Danmark ved Kielstrup Sø (EJ) i 1985. I 1986 og 1987 desuden fundet ved Sevel (NWJ). Ikke fundet siden.

#34 **Scolopostethus puberulus*

Denne art nævnes ikke i Andersen & Gaun (1974), men samlingerne på Naturhistorisk Museum i Århus (NHMA) rummer adskillige eksemplarer indsamlet i begyndelsen af 1900-tallet. Desuden er den i nyere tid indsamlet på mindst to lokaliteter.



Dictyla convergens (nymfe), *Rhynocoris annulatus* (rødringet rovtæge), *Himacerus apterus* (stor nymfetæge) (nymfe) og *Hydrometra stagnorum* (almindelig nåletæge).

Piesmatidae

#35 **Parapiesma salsolae*

Fundet på Samsø (EJ) i 1983. I 2011 fandtes den igen på lokaliteten, der indtil videre rummer den eneste kendte danske forekomst.

Berytidae

#36 *Gampsocoris punctipes* (krageklotæge)

Synonym: *Metacanthus punctipes*

Coreidae

#37 **Gonocerus acuteangulatus*

Fundet som ny art for landet i 2008, hvor nogle få eksemplarer blev fundet på Rømø (SJ). I 2009 er den desuden meldt fra distrikt F. (Fugle og Natur 2008b; Skipper 2009).

#38 **Leptoglossus occidentalis*

Denne art stammer oprindeligt fra Nordamerika, men er indslæbt til Europa. I 2009 og 2010 er den fundet i Danmark i distrikterne NWJ, F, LFM og NEZ. Sandsynligvis sekundært introduceret - kommet hertil ved egen hjælp fra bestande i et eller flere af vore nabolande (Buhl & Stephensen 2009; Fugle og Natur 2010).

Rhopalidae

#39 *Brachycarenum tigrinus* (bleg kanttæge)

Synonym: *Rhopalus tigrinus*

Rovtægen *Coranus aethiops* (sort rovtæge) er udskilt fra den noget lysere *Coranus subapterus* (grå rovtæge). Den er kun kendt fra Jylland, hvor den til gengæld er ret udbredt.

#40 **Liorhyssus hyalinus*

Fundet som ny art for Danmark i 2010, hvor den forekom i antal ved Århus (EJ) og Nærum (NEZ). (Ahlburg 2010).

#41 **Stictopleurus abutilon* (tørkekanttæge)

Meldt som ny for den danske fauna i 1993 fra distrikt B. Er nu vidt udbredt, pga. den massive invasion af værtsplanten brandbæger (*Senecio*) på brakmarker. (Trolle 1993; Tolsgaard 2001, 2009).

Thyreocoridae

#42 *Thyreocoris scarabaeoides* (blank tornben)

Var tidligere placeret i familien Cydnidae (tornben).

Pentatomidae

#43 **Arma custos* (kustodetæge)

Meldt som ny art for Danmark i 1992, hvor to eksemplarer blev fundet i opskyl på Dueodde (B). Er nu etableret på adskillige lokaliteter i distrikterne SJ, EJ, F, SZ og B. (Trolle 1992; Tolsgaard 2001, 2009).

#44 **Carpocoris purpureipennis* (purpurbredtæge)

Fundet som ny for landet i 1997, i distrikterne LFM og B. Er siden tillige fundet i distrikterne EJ, F og SZ. (Trolle 1998; Tolsgaard 2001, 2009).

Frøtægen *Orsillus depressus* blev fundet som ny for Danmark i 2008 i Botanisk Have i Århus. Er siden fundet i parker, haver og på kirkegårde flere steder i landet.



#45 *Chlorochroa juniperina* (enebærbredtæge)
Synonym: *Pitedia juniperina*

#46 *Chlorochroa pinicola* (fyrrebredtæge)
Synonym: *Pitedia pinicola*

#47 *Eysarcoris venustissimus* (gylden urtetæge)
Synonym: *E. fabricii*

#48 **Graphosoma lineatum* (stribetæge)
De første danske fund blev gjort i 1992, i flere distrikter. Er nu vidt udbredt i Danmark, især i den sydlige del af landet. (Trolle 1992; Tolsgaard 2001, 2009).

#49 *Holcostethus strictus* (lille bærtæge)
Synonym: *H. vernalis*

#50 **Piezodorus lituratus* (gyvelbredtæge)
Fundet som ny art for landet på Mols (EJ) i 1976. Har siden spredt sig voldsomt og er nu udbredt og almindelig i stort set hele landet. (Bech 1977; Tolsgaard 2001, 2009).

#51 **Sciocoris homalonotus* (stor kranstæge)
Et enkelt eksemplar blev fundet i opskyl ved Kandestederne (NEJ) i 1996. Herudover blev en population fundet ved Svenskehavn (B) i 2003. (Tolsgaard 2001, 2009; Trolle 2004).

#52 *Stagonomus bipunctatus* (toplettet urtetæge)
Synonym: *S. pusillus*

Acanthosomatidae

#53 **Elasmostethus brevis* (pileløvtæge)
Først erkendt som dansk art i 1983, hvor den blev fundet på tre lokaliteter i distrikt B. Den har sandsynligvis levet upåagtet i landet i længere tid. Forekommer spredt, men ikke almindeligt, over store dele af landet. (Trolle 1984; Tolsgaard 2001, 2009).

#54 **Elasmostethus minor*
Fundet som ny for Danmark i 2012, ved Gudhjem (B). Et enkelt individ blev desuden fundet samme år ved Utterslev Mose (NEZ).

* Angiver nye arter siden Andersen & Gaun (1974).

Lygaeidae (frøtæger)
<i>Stygnocoris pygmaeus</i> R.F. Sahlberg, 1848
(nu: <i>S. sabulosus</i> (Schilling, 1829))
Miridae (blomstertæger)
<i>Monosynamma nigrifula</i>
(nu: <i>M. bohemanni</i> (Fallén, 1829))
<i>Orthocephalus ferrarii</i>
(nu: <i>O. saltator</i> (Hahn, 1835))

▲ Tre arter udgår fra listen i Andersen & Gaun (1974), da de nu betragtes som synonymer.

Lygaeidae (frøtæger)
<i>Eremocoris fenestratus</i> (Herrich-Schaeffer, 1839). Et enkelt individ blev fundet ved Padborg Station (SJ) i 2011 (Enghoff, pers. medd.)
Pentatomidae (egentlige bredtæger)
<i>Eurydema ventralis</i> Kolenati, 1846. Fundet en enkelt gang, ved Aarhus Havn (EJ) i 1972 (Tolsgaard 2001).
<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758). Adskillige eksemplarer er fundet gennem årene, men indtil videre enkeltvis og formentlig indslæbt (Tolsgaard 2001, 2009; Fugle og Natur 2008c)
<i>Rhaphigaster nebulosa</i> (Poda, 1761). Kendt fra et enkelt individ fundet indendørs i Lille Lyngby (NEZ) i 2009. (Skipper 2009)

▲ En lille håndfuld arter er fundet tilfældigt indslæbt i Danmark

Pentatomidae (egentlige bredtæger)
<i>Eysarcoris aeneus</i> (Scopoli, 1763)
<i>Palomena viridissima</i> (Poda, 1761)
<i>Rubiconia intermedia</i> (Wolff, 1811)
Plataspididae
<i>Coptosoma scutellatum</i> (Geoffroy, 1785)
Scutelleridae (skjoldtæger)
<i>Phimodera flori</i> Fieber, 1863

▲ Ovenstående arter er angivet fra Danmark, hvilket må formodes at bero på fejltagelser (kilde: Aukema & Rieger 1995-2006)